



감귤 방제력 병·해충·잡초

※ 생육과정과 병해충 발생시기 자료는 농촌진흥청 자료를 근거로 제작하였습니다.

| 월별 | 1월 | | | 2월 | | | 3월 | | | 4월 | | | 5월 | | | 6월 | | | 7월 | | | 8월 | | | 9월 | | | 10월 | | | 11월 | | | 12월 | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|---|--------------------|---|---|-------------------------|---|---|--|---|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|----------------------|---|---|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 순별 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | | | | | | | | |
| 생육과정 | 꽃눈이 생기기 시작할때 | | | 꽃눈이 커질때 | | | 꽃눈이 다 커지고, 거름을 한창 빨아들일때 | | | 봄순 나올때 | | | 꽃이 한창 피고, 새뿌리 나오기 시작할때 | | | 제1차 생리낙과가 열매가 커지고 뿌리가 왕성하게 자랄때 | | | 제2차 생리낙과기, 여름순 나올때 | | | 열매가 가장 빨리 커지고, 두번째 뿌리 자랄때 | | | 가을순이 나오고, 극조생온주 익기 시작할때 | | | 조생온주 착색기, 세번째 뿌리 자랄때 | | | 뿌리자람이 끝나고, 열매익음이 끝날때 | | | 수확기 | | | | | | | | | | |
| 주요농작업 | 저장감귤관리 및 출하 | | | 간벌, 토양개량제 및 유기물 사용 | | | 정지전정 봄비료 사용 | | | 정지전정 | | | 봄순수르기 및 꽃비료 | | | 여름 비료주기 1차 적과 | | | 잡초방제, 2차적과 | | | 태풍대책 | | | 수상선과, 가을접 붙이기 | | | 극조생온주 수확, 조생온주 가을비료 | | | 조생온주 수확, 저장고 및 상자소독 | | | 보통온주 수확, 저장고 관리 | | | | | | | | | | |
| 병해충 방제 약제 | | | | | | | | | | <p>잿빛곰팡이병+더듬이병(참가병)</p> <p>프린트</p> <p>더듬이병(참가병)</p> <p>실바코플러스, 프린트, 안트라콜, 파리사드, 에머넌트</p> | | | | | | | | | <p>검은점무늬병(흑점병)</p> <p>프린트, 안트라콜</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>요소염면시비</p> <p>수세회복을 위한 염면시비</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <p>조팝나무진딧물</p> <p>모벤토, 메리트, 코니도(액상수화제), 칼립소</p> | | | | | | <p>조팝나무진딧물</p> <p>모벤토, 메리트, 코니도(액상수화제), 칼립소</p> | | | <p>굴굴나방</p> <p>코니도(액상수화제), 칼립소, 데시스</p> | | | <p>자나방</p> <p>메리트</p> | | | | | | <p>각지벌레류</p> <p>모벤토, 백승</p> | | | | | | <p>각지벌레류</p> <p>모벤토, 백승</p> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 과원잡초 알리온 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |